





پرسشنامه ASQ:SE2

تهیه و تنظیم: یاسمن جاودان

کارشناس کودکان

مرکز بهداشت شرق کرج

آذر ماه ۱۴۰۰

پرسشنامه ASQ:SE2

در کنار و همراه **ASQ III** استفاده می شود

- ۱- شامل سوالاتی است که نسبت به تاخیر های هیجانی - اجتماعی و اتیسم حساسیت دارد.
- ۲- فواید کلیدی بسیار دارد

۳- طیف سنی ۶۰، ۴۸، ۳۶، ۳۰، ۲۴، ۱۸، ۱۲، ۶، ۲ ماهگی

هرپرسشنامه ۷ حوزه رفتاری را در بر می گیرد

خود تنظیمی

تطبیق یافتن با شرایط فیزیولوژیک

پیروی

توانایی منطبق شدن با دیگران (پیروی از مقررات)

عملکرد تطبیقی

کنار آمدن با نیازهای فیزیولوژیک

استقلال

تمایل به خودآغازی و حرکت به سمت استقلال

عاطفه

نشان دادن احساسات یا همدلی با دیگران

ارتباطات اجتماعی

تعامل با دیگران (آغاز نمودن علایق و نیازها)

تعامل با دیگران

واکنشهای اجتماعی به بزرگسالان و همسن ها

ویژگی سوالات پرسشنامه ها

۱. قابلیت‌ها و توانایی‌های کودک را تشخیص می‌دهند
۲. معیارهای مهم تکامل هیجانی – اجتماعی و رفتارهای مشکل‌دار را پوشش می‌دهد
۳. مشاهده و ارزیابی رفتار ساده است
۴. در سطح تحصیلات کمتر از ششم ابتدایی نوشته شده
۵. هر پرسشنامه تعداد خاصی سوال دارد
۶. هیچ فاصله زمانی بین گروه‌های سنی ندارد
۷. نگرانی با علامت زدن در ستون مربوطه

انتخاب پرسشنامه مناسب سن کودک

برای دستیابی به نتیجه صحیح ، استفاده از پرسشنامه گروه سنی مناسب

❖ تفریق ساده برای محاسبه سن

❖ در کودکان ترم سن همان روز نباشد :

تا ۲ ماه : از یک ماه قبل تا یک ماه بعد

۶ تا ۳۰ ماه : از ۳ ماه

قبل تا ۳ ماه بعد

۳۶ ماه : از ۳ ماه قبل تا ۶ ماه بعد

۴۸ ماه : از ۶ ماه قبل تا ۶ ماه بعد

۶۰ ماه : از ۶ ماه

قبل تا ۱ سال بعد

❖ برای کودکانی که ۳ هفته یا بیشتر از ۳ هفته زودتر از موعد مقرر به دنیا

آمده اند (gestational age ۳۷ هفته یا کمتر) باید تا رسیدن به سن ۲ سالگی، سن

اصلاح شده آنها را حساب کرد (تعداد هفته‌هایی که زودتر به دنیا آمده‌اند از

۴۰ هفته کم کنیم) و پرسشنامه‌ای را که مطابق سن اصلاح شده است در اختیار

آنها گذاشت

دستورالعمل نحوه امتیازدهی نهایی

۱. پاسخ سوالات به صورت " اغلب یا همیشه " " گاهی " " به ندرت یا هرگز " " نگرانی در مورد این رفتار کودک " می باشد
۲. گزینه " اغلب یا همیشه " ۱۰ امتیاز
عدد رومی $x = 10$
۳. گزینه " گاهی " و " نگرانی در مورد این رفتار کودک " ۵ امتیاز
عدد رومی $v = 5$
۴. گزینه " به ندرت یا هرگز " صفر امتیاز
عدد رومی $z = 0$

۵. نهایتاً امتیازات کسب شده در هر پرسشنامه را جمع نموده و

دستور العمل نحوه امتیازدهی نهایی

۱. ابتدا پرسشنامه را از نظر یافتن سؤالات بی پاسخ مرور کنید
۲. اگر ۱ یا ۲ سوال بی پاسخ مانده نیاز به انجام کار خاصی نیست و امتیاز را به نقاط برش ببرید
۳. اگر ۳ سوال بی پاسخ مانده امتیاز کل را تقسیم بر تعداد کل سؤالات نموده و میانگین بدست آمده را در ۳ ضرب نموده و به جمع امتیاز قبلی اضافه کنید
۴. اگر ۴ سوال بی پاسخ مانده پرسشنامه باطل است

بررسی نقطه نظرات مکتوب

✓ در کنار برخی سوالات فضایی برای نوشتن نقطه نظرات اضافی والدین هست (دقت شود)

مثالها به شما در تفسیر کمک می کند:

❑ مشکل غذاخوردن (رفتار غیرطبیعی و غیر متناسب با سن)

❑ رفتارهای تکراری و مداوم : تکرار کار غیرطبیعی بارهر و بارها (بال بال زدن -بالا و پایین پریدن) بهتر است سوال شود

✓ سوالات کلی انتها به عنوان نشانه های عمومی هستند و نیاز به پیگیری دارد

✓ آخرین سوال در مورد چیزهای لذت بخش است

دستورالعمل نحوه امتیازدهی نهایی

۱. اگر امتیازات کودک پایین تر از نقطه برش باشد : عادی و طبیعی
 ۲. اگر امتیازات کودک در منطقه پایش باشد : تمهیدات برای حل مشکل ، سپس ۲ هفته بعد تست ، و مجدد ۲ ماه بعد تست انجام شود سپس ارجاع
 ۳. اگر امتیازات کودک بالاتر از نقطه برش : ارجاع به سطوح بالاتر
- لازم به ذکر است در مورد کودکانی که عادی و طبیعی بوده ولی والدینشان در بخش کلیات ابراز نگرانی میکنند مشابه کودکانی که در منطقه پایش قرار گرفته اند اقدام کنید

نکاتی در مورد نحوه ارجاع کودک

۱. از نگران و آشفته کردن پدر و مادر پرهیز کنید
۲. به زبان کاملاً ساده و قابل فهم برای سطح تحصیلی- اجتماعی آنها و ترجیحاً به زبان مادری یا بومی آنها، سخن بگویید
۳. اعلام کنید که نتایج ارزیابی حکایت از این داشته است که بررسی‌های دقیق‌تر و تخصصی‌تر بر روی کودک آنها لازم است
۴. استفاده از کلماتی چون «تست یا آزمون» «رد شدن از تست» «غیر طبیعی» و مانند این‌ها خودداری کنید
۵. مسئولیت تفسیر نتیجه برای ارجاع سطوح بالاتر با پزشک مرکز می باشد. پیگیری را الزاماً مراقب انجام میدهد.

سطوح ارجاع

❖ سن کودک کمتر از ۴۲ ماه: ارجاع به واحد بیلی (تست تشخیص تکامل)

با توجه نتیجه تست بیلی

۱ - مشکل ندارد : ادامه مراقبت و انجام تست غربالگری در سن بعدی

۲ - ارجاع می شود : پزشک معین تکامل شهرستان آقای دکترهادی منتظر لطف الهی

❖ سن کودک بالای ۴۲ ماه: ارجاع به متخصصین اطفال بیمارستان امام علی(ع)

نقاط برش پرسشنامه ASQ:SE-2

گروه سنی	نیازمند ارجاع (بیشتر از)	منطقه پایش	طبیعی (کمتر از)
۲	۳۵	۳۵-۳۰	۳۰
۶	۳۷/۵	۳۷/۵-۳۰	۳۰
۱۲	۴۲/۵	۴۲/۵-۴۰	۴۰
۱۸	۶۰	۶۰-۵۵	۵۵
۲۴	۶۰	۶۰-۵۵	۵۵
۳۰	۵۵	۵۵-۴۵	۴۵
۳۶	۶۵	۶۵-۶۰	۶۰
۴۸	۶۷/۵	۶۷/۵-۶۰	۶۰
۶۰	۷۰	۷۰-۶۰	۶۰



ممنون از توجه شما